

Późnoletni siew i podsiew użytków zielonych

Jeszcze w końcu sierpnia i na początku września możemy wykonywać nowe zasiewy użytków zielonych bądź podsiewać już istniejące. Jest to alternatywny termin w stosunku do wiosny, kiedy zwykle następuje spiętrzenie prac polowych. Cykl w jakim powinniśmy podsiewać łąki to około 4-5 lat. Zwykle po tym okresie następuje obniżenie plonowania i jakości zasiewów. Aby uzyskać zadowalający nas użytek kośny lub pastwisko powinniśmy go podsiać lub zasiać od nowa. Nowy zasiew wykonujemy jeśli nie rokuje dobrego plonowania i jakości np. ze względu na duże zachwaszczenie lub niski udział gatunków cennych.



Fot. 1. Siewnik do podsiewu

Podsiać użytek możemy siewnikiem specjalnym do podsiewu lub poprzez silne zbronowanie przyciętej darni. Do siewu wykorzystujemy wtedy siewnik zbożowy. Przy podsiewie ilość wysiewu nasion obniża się zwykle o 50% w stosunku do pełnego obsiewu. Wykonując siew późnoletni należy pamiętać o tym, że nie wszystkie gatunki mogą być podsiewane. W tym terminie należy unikać siewu lucerny. W mieszance do podsiewu z grupy traw powinny znajdować się głównie gatunki szybko rozwijające się: życica trwała, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita i kostrzewa łąkowa.



Fot. 2 Ruń koniczynowo-trawiasta

Z roślin motylkowatych szybko rozwija się koniczyna biała i czerwona. Nawożenie przedsiewne powinno uwzględniać przede wszystkim fosfor i potas. Zapewni to nam dobre przezimowanie młodych roślin. Przy podsiewie najlepiej całkowicie zrezygnować z nawożenia azotem lub może być to niewielka ilość startowa wynikająca np. z zastosowania nawozu wieloskładnikowego. Przy pełnym obsiewie dobrze jest zbadać odczyn gleby i określić zasobność gleby w P, K i Mg. Ewentualne wapnowanie, najlepiej przeprowadzić wapnem węglanowym z magnezem. Po pełnym zasiewie jak i po podsiewie istniejącego użytku nasiona należy przywałować.



Fot. 3. Ruń koniczynowo-trawiasta

Dariusz Krzywiec